

\*Platné od 1.1.2016

## Ledek amonný s vápencem

HNOJIVO ES

Označení typu:

Dusičnan amonný s vápencem

Dodavatel:

ARIMEX TRADE s.r.o.

Prokopa Velikého 572, 344 01 Domažlice

Celkový dusík jako N v %	27,0
Amonný dusík jako N v %	13,5
Dusičnanový dusík jako N v %	13,5

Čistá hmotnost volně loženo

### Rozsah a způsob použití:

Hnojivo je určeno k základnímu hnojení nebo přihnojení během vegetace. Hnojivo obsahuje dusičnanový a amonný dusík, a dále vápenec. Je vhodné pro všechny plodiny mimo azalek, rododendronů a kanadských borůvek.

### Doporučené dávkování:

Kultura	dávka kg/ha
Pšenice, žito, ječmen oz.	150-500
Ječmen j., oves	150-300
Okopaniny	150-500
Řepka	150-600
Kukuřice	350-700
Travní porosty	100-500
Cukrovka	200-500

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živin a jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních postupů.

### Doba použitelnosti:

18 měsíců při dodržení podmínek skladování.

### Datum výroby:

### Podmínky skladování:

Hnojivo musí být skladováno v suchých a větratelných skladech s nepropustnou podlahou odděleně od ostatních hnojiv, krmiv a ostatních látek. Ve skladech musí být zabráněno nekontrolovanému přístupu osob, zejména dětí. Hnojivo nesmí být ani přechodně skladováno ve vlhkém prostředí. Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Uchovávejte mimo dosah dětí.

V místech uložení hnojiva je nebezpečné pracovat s otevřeným ohněm a svářet.

### Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Prach granulovaného hnojiva v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty a může způsobovat i záněty spojivky, proto je třeba chránit především pokožku proti prachu oděvem a ochrannými rukavicemi, případně i sliznice protiprašným respirátorem a ochrannými brýlemi. Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst a kouřit. Po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

**Zasažení očí:** co nejrychleji a důkladně vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody.

**Požítí:** vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře. Nevyvolávejte zvracení.

**Zasažení pokožky:** rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv.

Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.