

*Platné od 1.1.2016

NPK 15-15-15

HNOJIVO ES

Označenie typu:

Hnojivo NPK

Dodávateľ:

ARIMEX Bratislava spol. s r. o.

Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Celkový dusík ako N v %	15,0
P ₂ O ₅ rozpustný v neutrálnom citrane amónnom a vo vode v %	15,0
Vodorozpustný P ₂ O ₅ v %	8,0
Vodorozpustný K ₂ O v %	15,0

Čistá hmotnosť voľne ložené

Rozsah a spôsob použitia:

Hnojivo je určené k základnému hnojeniu a k prihnojeniu V priebehu vegetácie. Je vhodné na zeleninu, jadrovinu, kôstkoviny, okrasné rastliny a trávniky. Menej vhodné na uhorky, papriku, tekvice, kerové drobné ovocie a jahody. NPK je trojzložkové hnojivo obsahujúce dusík, fosfor a draslík v ľahko prijateľnej forme pre rastliny.

Odporúčané dávkovanie:

Kultúra	dávka kg/ha
Pšenica, raž, jačmeň oz.	150-200
Jačmeň j., ovos	400-600
Okopaniny	400-500
Repka	300-400
Zelenina	400-500
Trávne porasty	300-400

Uvedené dávky vyjadrujú celkovú potrebu živín a sú iba orientačné. Pre konkrétne plodiny je vhodné upresniť dávky podľa zásoby fosforu v pôde, prípadne výživného stavu rastlín.

Doba použiteľnosti:

18 mesiacov pri dodržaní podmienok Skladovania.

Dátum výroby:

Podmienky skladovania:

Hnojivo musí byť skladované v suchých a vetrateľných skladoch s nepriepustnou podlahou oddelene od ostatných hnojív, krmív a ostatných látok. V skladoch musí byť zabránené nekontrolovanému prístupu osôb, hlavne detí. Hnojivo nesmie byť ani prechodne skladované vo vlhkom prostredí. Hnojivo ani jeho zbytky nesmú znečistiť vodné zdroje vrátane povrchových vôd. Uchovávať mimo dosah detí (S2).

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:

Prach granulovaného hnojiva v závislosti na koncentrácií dráždi pokožku, dýchacie cesty a môže spôsobovať aj zápaly spojiviek, preto je treba chrániť predovšetkým pokožku proti prachu odevom a ochrannými rukavicami, prípadne aj sliznice protiprachovým respirátorom a ochrannými okuliarmi. Po práci

a pred jedlom treba omyť pokožku rúk teplou vodou a mydlom a ošetriť reparačným krémom.

Zasiahnutie očí: čo najrýchlejšie a dôkladne vyplachovať obidva spojivkové vaky prúdom čistej vody (S26).

Požitie: vypiť okamžite po požití 0,5 l vlažnej vody a vyhľadať lekára.

Zasiahnutie pokožky: rýchlo opláchnuť dostatočným množstvom vody, neskôr dôkladne, ale bez veľkého mechanického dráždenia omyť vodou a mydlom, odstrániť zasiahnutý odev (S28).

Vo všetkých ťažších prípadoch, pri požití alebo zasiahnutí očí vždy vyhľadať lekársku pomoc.